

SITUATION HYDROCLIMATIQUE

Bassin de Corse – Juin 2026

RESUME

Après un hiver extrêmement pluvieux (+100 %) et un printemps sec (-26 %), un été très sec démarre en Corse. En effet, au mois de juin, la Corse est en déficit de -80 % avec à peine 8 mm de précipitations agrégées sur chacun des 2 départements. Les sols se sont fortement asséchés, l'indice d'humidité des sols est proche du record minimum de juillet 2022.

En ce qui concerne les eaux souterraines, à l'échelle régionale, 3% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 3% une tendance stable et 94% une tendance à la baisse. En termes de dynamique, environ 39% des nappes (avec IP) du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 5% des niveaux égaux à la moyenne et 56% des niveaux sous la moyenne.

Le déficit pluviométrique très marqué a provoqué une forte baisse généralisée des écoulements par rapport au mois passé. Ils demeurent majoritairement médians à légèrement secs en Haute-Corse et plus secs en Corse-du-Sud comme sur la Solenzara et le Liamone où la décennale sèche est respectivement atteinte et dépassée.

La majorité des barrages tant d'EDF que de l'OEHC se situent dans la moyenne.

Les campagnes menées par l'OFB (observatoire national des étiages) les 25 et 26 juin dernier mettent en évidence deux assecs en Haute-Corse, l'Ostriconi et le Fiume Seccu, et deux autres en Corse-du-Sud, la Favone et le Chiuni.

SOMMAIRE

p. 2 Précipitations


p. 4 Eaux souterraines

p. 8 Eaux de surface

p.13 Ressource stockée

p.18 Observatoire des étiages (OFB)

<https://www.corse.developpement-durable.gouv.fr>



Bilan des précipitations du mois :

Nota Bene : les commentaires et cartes associées de cette rubrique sont directement issus du bulletin de situation hydrologique produit et diffusé par Météo France

Bilan des précipitations du mois :

Après un hiver extrêmement pluvieux (+100 %) et un printemps sec (-26 %), un été très sec démarre en Corse.

En effet, au mois de juin, la Corse est en déficit de -80 % avec à peine 8 mm de précipitations agrégées sur chacun des 2 départements.

Les cumuls de pluies sont compris entre 10 et 20 mm dans la vallée du Tavignano, le Cortenais, le Taravo et la chaîne centrale. Ils sont inférieurs à 10 mm partout ailleurs.

En conséquence, le déficit du cumul pluviométrique mensuel est supérieur à 75 % sur la majorité des micro-régions. Il est compris entre 50 et 75 % sur les vallées occidentales, le Cortenais et une partie de la plaine orientale.

Situation depuis le début de l'année hydrologique (septembre 2025) :

Depuis septembre 2025, les cumuls atteignent :

* 500 à 700 mm du littoral Balanin à l'extrême sud et de la plaine d'Aléria au sud de Bastia,

* 800 à 1200 mm dans le Cortenais, la Castagniccia et les vallées occidentales,

* 1300 à plus de 1800 mm en montagne.

La Corse-du-Sud présente un petit excédent de +3 % moyenné sur son territoire, avec 1000 mm de pluies agrégées. Le littoral occidental est déficitaire de -10 %. Les vallées de l'ouest et l'extrême sud se situent autour de la normale. La montagne est excédentaire de +10 à +30 %.

En Haute-Corse, l'excédent atteint +10 % avec 990 mm de pluies agrégées sur la période. La Casinca et la Costa Verde sont déficitaires de -10 %. Du sillon central au Fium'Orbo et en montagne, la situation est excédentaire de +10 à +40 %. Les autres micro-régions se situent autour de la normale.



Les précipitations efficaces du mois :

Le bilan pluie-ETR est négatif, compris entre :

* -50 et -75 mm, de la Castagniccia au Cortenais et en montagne,

* -25 et -50 mm sur la majeure partie de l'île,

* 0 et -25 mm sur la région Ajaccienne et dans l'extrême sud.

Situation des précipitations efficaces depuis le début de l'année hydrologique (septembre) :

Depuis le 1^{er} septembre 2025, grâce à un hiver très fortement arrosé, toute la région connaît un bilan pluie-ETR élevé :

* +100 à +400 mm sur le littoral de la Corse-du-Sud, de la Balagne au Nebbio, dans le

Cap Corse, sur la côte orientale d'Aléria à Vescovato et dans l'extrême sud,

* +500 à +750 mm, dans le Cortenais, le Fium'Orbo et les hautes vallées occidentales,

* +750 à +1500 mm sur le relief central.

Depuis septembre, les cumuls de pluie efficaces sont :

* déficitaires entre -25 et -50 % sur le littoral occidental,

* déficitaires entre -10 et -25 %, sur la Casinca, la Costa Verde,

* au niveau des normales dans les moyennes vallées de l'ouest, la région Bastiaise et la Castagniccia,

* excédentaires entre +10 et +25 % dans le Cortenais et l'extrême sud,



* excédentaires entre +25 et +50 % de la Balagne au Nebbio, dans le Fium'Orbo, la côte des nacres et en montagne.

Humidité des sols superficiels – situation au 1^{er} avril 2026 :

À l'échelle régionale, l'indice d'humidité des sols est resté en dessous du 1^{er} décile durant tout le mois de juin. Au 1^{er} juillet, il se situe proche du record minimum du 1^{er} juillet 2022.

En juin, les sols se sont fortement asséchés sur l'ensemble de la région à l'exception de la haute montagne. Ils sont devenus très secs, proche du littoral, en particulier en Balagne, le long de la façade occidentale, dans l'extrême sud et sur la plaine orientale. L'indice d'humidité est déficitaire de -60 à -80 % sur l'ouest, jusqu'à -90 % dans le sud de l'île, de -50 à -60 % en Balagne, -40 à -50 % sur la plaine orientale et le Cap Corse, -30 % sur le Cortenais et la Castagniccia.

Cartes des précipitations de juin 2026



Recharge des nappes au 1^{er} juillet 2026

Type d'aquifère

- Zones alluviales à fort potentiel aquifère
- Terrains sédimentaires sans grandes nappes
- Terrains métamorphiques sans grandes nappes
- Terrains cristallins sans grandes nappes

Niveau des nappes

- Absence de données
- Niveaux très hauts
- Niveaux hauts
- Niveaux modérément hauts
- Niveaux autour de la moyenne
- Niveaux modérément bas
- Niveaux bas
- Niveaux très bas

Evolution récente des niveaux

- En hausse
- Stable
- En baisse

0 10 20 Km

Méthodologie :

L'évolution récente traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport au mois précédent (stable, à la hausse ou à la baisse).

L'indicateur du niveau des nappes traduit quant à lui l'écart à la moyenne de la chronique du mois courant. Il est réparti en sept classes, du niveau le plus bas (en rouge), au niveau le plus haut (en bleu foncé).



Fin juin à l'échelle régionale, 3% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 3% une tendance stable et 94% une tendance à la baisse. En termes de dynamique, environ 39% des nappes (avec IP) du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 5% des niveaux égaux à la moyenne et 56% des niveaux sous la moyenne.

Situation des nappes au 1^{er} juillet 2026

Nappe alluviale du Meria à Meria



La nappe alluviale côtière de Meria est une nappe libre reposant sur un substratum schisteux. Elle est suivie depuis 1977, au niveau des forages BSS002MWRF (11024X0102/MARINE) pour la période 1977 – 2008, et BSS002MWRS (11024X0113/PIEZO), de 2009 à aujourd’hui.

Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +1,88 m NGF soit 0,19 m en dessus de la médiane calculée du mois (+1,69 m NGF). La tendance à la baisse s’accroît, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio

La nappe alluviale côtière de la Strutta est une nappe libre drainée par le ruisseau de la Strutta et reposant sur un substratum calcaire karstifié du Miocène (possiblement en connexion hydraulique). Elle est suivie depuis 1977 jusqu’à aujourd’hui au niveau du forage BSS002MWYY (11038X0105/STRU) situé à Patrimonio.

Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +2,59 m NGF soit 0,29 m inférieur à la décennale sèche calculée du mois (+2.88 m NGF). La tendance à la baisse s’accroît, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.






Situation des nappes au 1^{er} juin 2026

Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia

La nappe alluviale du Bevinco appartenant au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca, est une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle est suivie depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002MYSA (11071X0062/CASATO) situé à Biguglia.


Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +2,26 m NGF soit 0,20 m inférieur à la médiane calculée du mois (+2,46 m NGF). La tendance à la baisse s'accroît, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.



Nappe Alluviale du Golo à Lucciana

La nappe alluviale du Golo au même titre que celle du Bevinco appartient au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca. Il s'agit d'une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle a été suivie de 1997 à 2022 au niveau du forage BSS002MZLS (11076X0086/CANONI) situé à Lucciana

Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +0,80 m NGF. La nappe suivie par cet ouvrage étant influencée par le barrage de Calacuccia, le maintien des niveaux devrait se poursuivre durant les prochaines semaines.



Situation des nappes au 1^{er} juillet 2026

Nappe Alluviale de la Bravone à Linguizzetta



La nappe alluviale de la Bravone est une nappe libre reposant sur un substratum Miocène. Elle est suivie depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCNK (11156X0009/BRAVON) situé à Linguizzetta.

Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +10,86 m NGF soit 0,07 m supérieur à la médiane calculée du mois (+10,73 m NGF). La tendance à la baisse s'accroît, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe alluviale du Liamone à Coggia

La nappe alluviale du Liamone est une nappe libre reposant sur un substratum granitique. Elle est suivie depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCSD (11172X0119/COSCIA) situé à Coggia.

Le niveau atteint le 30 juin 2026 est de +4,70 m NGF soit 0,03 m inférieur à la décennale sèche calculée du mois (+4,73 m NGF). La phase de vidange qui a débuté en avril s'accroît.



EAUX DE SURFACE

Carte des débits moyens mensuels et d'été au 30/06/2026

Cours d'eau	Station (*)	Secteur	Q3J-N JUN 2026 m3/s	T	min connu du Q3J-N m3/s	max connu du Q3JN m3/s	Qm M JUN 2026 m3/s	T	min connu du Qm M m3/s	max connu du Qm M m3/s	10 % du module l/s	QM-NA5 l/s
Luri	Piazza – Piazza	Cap & région	0.013	3 S	0 (1989)	0.26 (1984)	0.025	4 S	0 (1989)	0.473 (1984)	19.6	3.16
Bevinco	Lancone	Bastiaise	0.110	2 S	0.02 (1989)	0.443 (1980)	0.173	3 S	0.039 (1989)	1.36 (1994)	66.8	38
Golo	Albertacce*	Golo	0.16	3 S	0.131 (1993)	1.53 (2018)	0.67	5 S	0.323 (1993)	8.21 (1984)	317	137
Asco	Pte-Leccia	Golo	0.80	3 H	0.117 (2022)	2.41 (2018)	1.68	2 S	0.462 (2022)	6.44 (2023)	481	45
Golo	Barchetta	Golo	1.86	5 S	0.944 (2025)	15.2 (1984)	3.57	6 S	2.04 (2022)	32.6 (1980)	1500	1540
Fium'Alto	Acitaja	P.O	0.308	3 S	0.11 (1989)	1.37 (2008)	0.546	2 S	0.176 (1979)	2.85 (2008)	138	144
Fium'Orbo	Sampolo*	P.O	1.28	2 S	0.522 (2003)	4.62 (1963)	2.22	2 S	0.912 (2022)	7.21 (1984)	377	348
Restonica	Corte	Tavignano	1.01	3 H	0.173 (2022)	1.76 (2014)	2.24	4 H	0.435 (2022)	3.61 (2013)	191	134
Vecchio	Noceta	Tavignano	0.76	4 S	0.395 (2022)	5.72 (1963)	1.70	3 S	0.717 (1964)	7.93 (1963)	501	256
Tavignano	Antisanti3	Tavignano	2.51	2 S	0.923 (2022)	13.5 (1963)	4.55	3 S	1.84 (2022)	31.6 (1984)	1112	588
Fango	Galeria *	Balagne	0.197	2 S	0.06 (2003)	1.08 (1978)	0.302	7 S	0.17 (2022)	4.24 (1997)	224	43
Porto	Ota *	à	0.138	16 S	0.092 (2017)	0.719 (2010)	0.253	9 S	0.14 (2017)	6.27 (1997)	282	100
Liamone	Truggia*	région	0.56	12 S	0.29 (2017)	5.65 (1971)	1.3	13 S	0.601 (2022)	12.3 (1997)	902	397
Gravone	Péri	ajaccienne	0.411	5 S	0.136 (2003)	3.17 (2018)	0.996	4 S	0.401 (2003)	7.22 (1997)	486	167
Taravo	Pont d'Abra*	Sud	1.64	5 S	0.985 (2003)	7.85 (1971)	2.39	6 S	1.6 (2003)	13.9 (1971)	733	939
Solenzara	Cannicciu*	Sud	0.173	9 S	0.12 (1990)	0.761 (2018)	0.253	10 S	0.209 (2001)	4.82 (1984)	236	121
Ortolo	Vignalella*	Sud	0.022	6 S	0.016 (2022)	0.225 (2018)	0.049	6 S	0.028 (2022)	0.592 (2008)	38	11

DREAL de
CORSE




Service Délégation de Bassin et Hydrométrie

Débits moyens mensuels et d'étiage – Juin 2026

DREAL de
CORSE





Service Délégation de Bassin et Hydrométrie




Le déficit pluviométrique très marqué a provoqué une forte baisse généralisée des écoulements par rapport au mois passé. Ils demeurent majoritairement médians en Haute-Corse et plus secs en Corse du Sud comme sur la Solenzara et le Liamone où la décennale sèche est respectivement atteinte et dépassée.

Graphiques des débits moyens mensuels





Graphiques des débits d'étiage



- - - - - Décennal sec
 — Quinquennal sec
 — Médian (T= 2 ans)
 — 2025-2026



Situation des barrages EDF au 30/06/26



Pour le mois considéré








Ouvrage (Hm3)	Capacité maximale	Volume au 30/06/26	% au 30/06/26
Tolla (Prunelli)	34.500	31.947	93 %
Calacuccia (Golo)	25.000	23.104	92 %
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	1.563	98 %
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.920	72 %



Situation des barrages OEHC au 29/06/ 2026

Barrages et réserves OEHC				
Ouvrage (Hm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume au 29/06/2026	% au 29/06/2026
Rogliano	Cap Corse	0.0476	0.0390	82 %
Padule	Région bastiaise	1.900	1.608	85 %
Codole	Balagne	6.600	5.432	82 %
Alesani	P.O.	10.550	8.210	78 %
Peri	P.O.	1.830	0.698	38 %
Bacciana	P.O.	2.350	2.070	88 %
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	2.517	58 %
Alzitone	P.O.	5.622	4.699	84 %
Ospedale	Sud	3.251	2.893	89 %
Ortolo	Sud	2.920	2.378	81 %
Figari	Sud	5.714	4.643	81 %




Situation des barrages OEHC au 29/06/2026



— maxi
 — moyenne
 - - - mini
 — 2025-2026
 pour le mois considéré

N.B : les données fournies par l'OEHC au mois de juin ne sont que celles du volume au 29 juin (nous ne disposons donc pas des données des 3 semaines précédentes que nous avons artificiellement alignées sur la dernière valeur du mois de mai).




Situation des barrages OEHC au 29/06/2026



— maxi
— moyenne
- - - mini
— 2025-2026

Pour le mois considéré

Situation des barrages OEHC au 29/06/2026



— maxi
— moyenne
- - - mini
— 2025-2026

Pour le mois considéré



2 cours d'eau en assec en Haute-Corse :

- L'Ostriconi au pont de Trepide
- Le Fiume Seccu au pont de la RD 151

*Campagne usuelle d'observation du 26/06/26
Haute-Corse*



2 cours d'eau en assec en Corse-du-Sud :

- La Favone sur la piste DFCI à l'amont de la confluence avec le Barrarecciu
- Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni

*Campagne usuelle d'observation du 25/06/26
Corse-du-Sud*