

SITUATION HYDROCLIMATIQUE

Bassin de Corse – Juillet 2026

RESUME

La sécheresse s'est poursuivie et accentuée sur l'île au cours du mois de juillet.

La Corse est en déficit de -80 % au niveau pluviométrique, avec à peine 4 mm de précipitations agrégées sur chacun des 2 départements. Les cumuls de pluies sont en général inférieurs à 5 mm. Le déficit du cumul pluviométrique mensuel dépasse les 75 % sur la majorité des micro-régions.

En ce qui concerne les eaux souterraines, à l'échelle régionale, 3% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 13% des points suivis présentent une tendance stable et 84% présentent une tendance à la baisse.

En termes de dynamique, environ 31% des nappes du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 11% des nappes présentent des niveaux égaux à la moyenne et 58% des nappes présentent des niveaux sous la moyenne.

Comparativement au mois dernier, les débits mensuels de juillet ont chuté de plus de la moitié sur la majorité des cours d'eau. Malgré les pics de chaleur et l'absence quasi-totale de précipitations, ils n'ont pas atteint des valeurs records. Les fortes baisses relevées sont plus marquées en Corse du Sud où la décennale sèche est approchante sur l'Ortolo et la Solenzara et dépassées sur le Fango, le Liamone et le Porto. En Haute-Corse le Golo à Barchetta, le Vecchio et le Tavignano sont légèrement secs. Tous les autres cours d'eau sont dans la moyenne

Les barrages de l'Alesani, de Bacciana, de Calacuccia, de l'Ospedale et de Rogliano sont dans la moyenne mensuelle observée ; tous les autres sont en dessous, voire très en dessous de la moyenne.

Dans le cadre de l'observatoire national des étiages, les campagnes menées par l'OFB les 23 et 27 juillet derniers font état de 4 assecs et 2 écoulements non visibles en Haute-Corse et 2 assecs en Corse-du-Sud.



SOMMAIRE

p. 2 Précipitations

p. 4 Eaux souterraines

p. 8 Eaux de surface

p.13 Ressource stockée

p.18 Observatoire des étiages (OFB)

PRECIPITATIONS

Bilan des précipitations du mois :

Nota Bene : les commentaires et cartes associées de cette rubrique sont directement issus du bulletin de situation hydrologique produit et diffusé par Météo France

Bilan des précipitations du mois :

La sécheresse s'est poursuivie et accentuée sur l'île au cours du mois de juillet. Ce mois-ci, la Corse est en déficit de -80 % au niveau pluviométrique, avec à peine 4 mm de précipitations agrégées sur chacun des 2 départements. Les cumuls de pluies sont en général inférieurs à 5 mm. Ils atteignent 10 à 15 mm localement en montagne et très localement 30 à 35mm en Castagniccia et à Bonifacio à la faveur d'orages isolés. En conséquence, le déficit du cumul pluviométrique mensuel dépasse les 75 % sur la majorité des micro-régions.

Situation depuis le début de l'année hydrologique (septembre 2025) :

Depuis septembre 2025, les cumuls atteignent :

- * 500 à 700 mm du littoral Balanin à l'extrême sud et de la plaine d'Aléria au sud de Bastia,
- * 800 à 1200 mm dans le Cortenais, la Castagniccia et les vallées occidentales,
- * 1300 à plus de 1800 mm en montagne.

La Corse-du-Sud présente un petit excédent de +2 % moyenné sur son territoire, avec 1003 mm de pluies agrégées depuis le 1^{er} septembre 2025. Le littoral occidental est déficitaire de plus de 10 %. Les vallées de l'ouest et l'extrême sud se situent autour de la normale. La montagne est excédentaire de +10 à +30 %. En Haute-Corse, l'excédent atteint +8 % avec 994 mm de pluies agrégées sur la période. La Casinca et la Costa Verde sont déficitaires de -10 %. Du sillon central au Fiumorbo et en montagne, la situation est excédentaire de +10 à +40 %. Les autres micro-régions se situent autour de la normale



Les précipitations efficaces du mois :

Le bilan pluie-ETR est négatif, compris entre :

- * 0 et -25 mm sur le pourtour littoral de la Balagne, l'ouest et le sud de l'île, la plaine orientale.
- * -25 et -50 mm partout ailleurs.

Situation des précipitations efficaces depuis le début de l'année hydrologique (septembre) :

Depuis septembre, les cumuls de pluie efficaces sont :

- * déficitaires entre -25 et -50 % sur le littoral occidental, la Casinca et la Costa Verde,
- * au niveau des normales dans les moyennes vallées de l'ouest, la région Bastiaise et la Castagniccia,
- * excédentaires entre +10 et +25 % dans le Cortenais et l'extrême sud,
- * excédentaires entre +25 et +50 % de la Balagne au Nebbio, dans le Fiumorbo, la côte des nacres et en montagne

Humidité des sols superficiels – situation au 1^{er} août 2026 :

À l'échelle régionale, l'indice d'humidité des sols est resté en dessous du 1^{er} décile durant tout le mois de juillet.

Au 1^{er} août, il est pratiquement égal au record minimum établi le 1^{er} août 2022.


En juillet, les sols ont continué de s'assécher sur l'ensemble de la région.

Ils sont devenus extrêmement secs sur l'ensemble de l'île.


L'indice d'humidité est déficitaire de :

- * -90 % sur la Corse-du-Sud, le Fium'orbo et le sud de la plaine orientale,
- * -70 à -80 % de la Balagne à la région Bastiaise jusqu'au Cap Corse,
- * -50 à -60 % sur le Cortenais et la Castagniccia.

Cartes des précipitations de juillet 2026



Recharge des nappes au 1^{er} août 2026



A l'échelle régionale, 3% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 13% des points suivis présentent une tendance stable et 84% présentent une tendance à la baisse.

A fin juillet, environ 31% des nappes (avec IP) du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 11% des nappes présentent des niveaux égaux à la moyenne et 58% des nappes présentent des niveaux sous la moyenne.

À l'échelle de la Haute-Corse, les niveaux suivis présentent une situation piézométrique allant de niveau modérément haut (Aliso) à niveaux bas (Figarella).

À l'échelle de la Corse-du-Sud, les niveaux suivis présentent une situation piézométrique allant de très haut (Taravo) à très bas (Liamone).

L'évolution du niveau des nappes de la façade Ouest et du Cap-Corse sera à surveiller durant les prochaines semaines.

Situation des nappes au 1^{er} août 2026

Nappe alluviale du Meria à Meria



La nappe alluviale côtière de Meria est une nappe libre reposant sur un substratum schisteux. Elle est suivie depuis 1977, au niveau des forages BSS002MWRF (11024X0102/MARINE) pour la période 1977 – 2008, et BSS002MWS (11024X0113/PIEZO), de 2009 à aujourd’hui.

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +1,06 m NGF soit 0,74 m en dessous de la médiane calculée du mois (+1,80 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio

La nappe alluviale côtière de la Strutta est une nappe libre drainée par le ruisseau de la Strutta et reposant sur un substratum calcaire karstifié du Miocène (possiblement en connexion hydraulique). Elle est suivie depuis 1977 jusqu’à aujourd’hui au niveau du forage BSS002MWYY (11038X0105/STRU) situé à Patrimonio.

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +1,55 m NGF soit 0,32 m inférieur à la décennale sèche calculée du mois (+1,87 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.



Situation des nappes au 1^{er} août 2026

Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia



La nappe alluviale du Bevinco appartenant au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca, est une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle est suivie depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002MYSA (11071X0062/CASATO) situé à Biguglia.

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +1,57 m NGF soit 0,40 m inférieur à la médiane calculée du mois (+1,97 m NGF). La tendance à la baisse s'accroît, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe Alluviale du Golo à Lucciana

La nappe alluviale du Golo au même titre que celle du Bevinco appartient au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca. Il s'agit d'une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle a été suivie de 1997 à 2022 au niveau du forage BSS002MZLS (11076X0086/CANONI) situé à Lucciana

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +0,88 m NGF. La nappe suivie par cet ouvrage étant influencée par le barrage de Calacuccia, le maintien des niveaux devrait se poursuivre durant les prochaines semaines.



EAUX SOUTERRAINES

Situation des nappes au 1^{er} août 2026

Nappe Alluviale de la Bravone à Linguizzetta



La nappe alluviale de la Bravone est une nappe libre reposant sur un substratum Miocène. Elle est suivie depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCNK (11156X0009/BRAVON) situé à Linguizzetta.

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +10,69 m NGF soit 0,05 m supérieur à la médiane calculée du mois (+10,64 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.


Nappe alluviale du Liamone à Coggia

La nappe alluviale du Liamone est une nappe libre reposant sur un substratum granitique. Elle est suivie depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCSD (11172X0119/COSCIA) situé à Coggia.

Le niveau atteint le 31 juillet 2026 est de +4,62 m NGF soit 0,01 m inférieur à la décennale sèche calculée du mois (+4,63 m NGF). La phase de vidange qui a débuté en avril ralentit, le niveau de basse semble atteint.



Carte des débits moyens mensuels et d'étiage au 31/07/2026



DREAL de
CORSE





Service Délégation de Bassin et Hydrométrie

*Débits moyens mensuels et d'étiage – Juillet 2026*

Cours d'eau	Station (*)	Secteur	Q3J-N JUILLET 2026 m3/s	T	min connu du Q3J-N m3/s	max connu du Q3J-N m3/s	QmM JUILLET 2026 m3/s	T	min connu du QmM m3/s	max connu du QmM m3/s	10 % du module l/s	QM-NA5 l/s
Luri	Piazza – Piazza	Cap & région	0.008	2 S	0 (1975)	0.071 (1984)	0.011	4 S	0 (1989)	0.129 (1984)	19.6	3.16
Bevinco	Lancône	Bastaise	0.068	2 H	0.012 (1989)	0.24 (1983)	0.086	2 S	0.017 (1989)	0.361 (1976)	66.8	38
Golo	Albertacce *	Golo	0.142	3 S	0.064 (2005)	0.562 (2013)	0.203	5 S	0.101 (1993)	1.18 (2019)	317	137
Asco	Pte-Leccia	Golo	0.156	3 H	0.02 (2022)	0.792 (2013)	0.473	3 H	0.056 (2022)	2.15 (2013)	481	45
Golo	Barchetta	Golo	1.54	3 S	0.522 (1977)	7.32 (1984)	2.57	3 S	1.24 (1977)	10.4 (1976)	1500	1540
Fium'Alto	A citaja	P.O	0.164	4 S	0.08 (1989)	0.739 (1976)	0.211	4 S	0.128 (1982)	0.948 (1976)	138	144
Fium'Orbo	Sam polo *	P.O	0.440	4 S	0.256 (2003)	3.83 (1976)	0.617	4 S	0.348 (2003)	4.06 (1976)	377	348
Restonica	Corte	Tavignano	0.250	2 H	0.13 (2023)	0.828 (2013)	0.468	2 S	0.181 (2012)	1.44 (2013)	191	134
Vecchio	Noceta	Tavignano	0.225	7 S	0.163 (1991)	1.82 (1976)	0.396	7 S	0.251 (2022)	3.44 (1983)	501	256
Tavignano	Artisaniti	Tavignano	0.464	11 S	0.422 (2022)	10.2 (1980)	1.12	6 S	0.566 (2022)	11.6 (1980)	1112	588
Fango	Galeria *	Balagne	0.060	2 S	0.017 (1990)	0.349 (1978)	0.112	3 S	0.032 (2003)	1.88 (2019)	224	43
Porto	Ota *	à	0.095	6 S	0.062 (2002)	0.370 (2010)	0.111	13 S	0.094 (2003)	0.738 (2019)	282	100
Liamone	Truggia *	région	0.35	6 S	0.225 (2017)	2.18 (1971)	0.411	14 S	0.308 (2022)	3.08 (1971)	902	397
Gravone	Péri	ajaccienne	0.206	9 S	0.112 (2003)	1.59 (2013)	0.138	6 S	0.088 (2003)	0.85 (2013)	486	167
Taravo	Pont d'Abra *	Sud	1.11	3 S	0.669 (2007)	3.73 (1971)	1.35	4 S	0.794 (2003)	4.94 (1971)	733	939
Solenzara	Cannicciu *	Sud	0.107	8 S	0.066 (1991)	0.418 (1980)	0.146	9 S	0.081 (1990)	0.579 (1976)	236	121
Ortolo	Vignalella *	Sud	0.005	20 S	0.002 (2022)	0.088 (2018)	0.013	9 S	0.008 (2022)	0.173 (2018)	38	11


Comparativement au mois dernier, les débits mensuels de juillet ont chuté de plus de la moitié sur la majorité des cours d'eau. Malgré les pics de chaleur et l'absence quasi-totale de précipitations, ils n'ont pas atteint des valeurs records. Les fortes baisses relevées sont plus marquées en Corse du Sud où la décennale sèche est approchante sur l'Ortolo et la Solenzara et dépassées sur le Fango, le Liamone et le Porto. En Haute-Corse le Golo à Barchetta, le Vecchio et le Tavignano sont légèrement secs. Tous les autres cours d'eau sont dans la moyenne.

Graphiques des débits moyens mensuels





Graphiques des débits d'étiage

- - - - - Décennal sec
 ——— Quinquennal sec
 ——— Médian (T= 2 ans)
 —●— 2025-2026





RESSOURCES STOCKEES

Situation des barrages EDF au 30/06/26



Pour le mois considéré



Ouvrage (Hm3)	Capacité maximale	Volume au 31/07/26	% au 31/07/2026
Tolla (Prunelli)	34.500	25.898	75 %
Calacuccia (Golo)	25.000	18.717	75 %
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	1.032	65 %
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.730	57 %








Situation des barrages OEHC au 01/08/2026

Barrages et réserves OEHC				
Ouvrage (Hm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume au 01/08/2026	% au 01/08/2026
Rogliano	Cap Corse	0.0476	0.0303	64 %
Padule	Région	1.900	1.338	70 %
Codole	Balagne	6.600	4.296	65 %
Alesani	P.O.	10.550	5.585	53 %
Peri	P.O.	1.830	0.790	43 %
Bacciana	P.O.	2.350	2.030	86 %
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	0.589	14 %
Alzitone	P.O.	5.622	2.332	41 %
Ospedale	Sud	3.251	2.213	68 %
Ortolo	Sud	2.920	1.753	60 %
Figari	Sud	5.714	3.401	60 %

RESSOURCES STOCKEES




Situation des barrages OEHC au 01/08/26



— maxi
— moyenne
- - - mini
— 2025-2026

pour le mois considéré

Situation des barrages OEHC au 01/08/26






— maxi
 — moyenne
 - - - mini
 — 2025-2026

Pour le mois considéré



Situation des barrages OEHC au 01/08/26



— maxi
— moyenne
- - - mini
— 2025-2026

Pour le mois considéré

Campagne usuelle d'observation du 23 juillet 2026 Haute-Corse

Campagne usuelle d'observation du 27 juillet 2026 Corse-du-Sud



4 Assecs :

- L'Ancino au pont de la RD 18
- Le Bevinco au passage à gué de la salle des fêtes
- L'Ostriconi au pont de Trepide,
- Le San Clemente au pont génois
- Le Fium'Seccu au pont de la RD 151

2 écoulements non visibles :

- La Tartagine au pont de la RD.547
- L'Aliso au passage à gué de Ghiuncaia



2 Assecs :

- Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni
- La Favone sur la piste DFCI